



PERFECCIONANT EL MANEIG DE LA RECRIA



CALOSTRE

La regla de les 4Q:


Qualitat:

Quan: Abans de les 4h

Quantitat: 10% del seu pes

Q(ontaminació): Maximitzar la higiene

Qualitat	BRIX%
Excel·lent	>23
Bona	20-23
Dolenta	<20



ELS 3 PRIMERS DIES



DIA 1: 3+3L de calostre

DIA 2 i 3: 3+3L de llet^a de transició (llet de 2^a-3^a muntada)

ALIMENTACIÓ



- LLET: Font de nutrients i substàncies bioactives. Important higiene i temperatura per evitar creixements de microorganismes (considerar pasteurització).
- LLET DE REBUIG: Mateix maneig que l'anterior. Si és amb residus d'antibiòtics, es transmeten resistències (evitar).
- LLET EN POLS:
 - Proteïna Bruta 24 (millor si és d'origen làctic)
 - Greix >20%.
 - Olis vegetals com coco o palma (fàcil digestió).
 - Lactosa <55% (evitar diarrea)



Semega

Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada de la Diputació de Girona

IRTA

RECERCA | TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES

MANEIG DE L'ALIMENTACIÓ



IDEAL

Benestar

simulació lactància natural



Passar a grup el
més aviat possible

A TENIR EN COMPTE



-Durant 3 primeres setmanes: 6L de llet o llet en pols al 15%
(150g en 850g d'aigua)/dia ---- repartits en 2 tomes.


-Deslletament: Quan consumeixin 1,5kg de pinsoldia --- Anar disminuint gradualment l'oferta de llet.

PINSO

-PB: 20%

-Estimular el seu consum:

- Presència de flocs de cereals o grans partits
- Oferir farratge/palla



Semega


Serveis de Millora i Expansió Ramadera
i Genètica Aplicada
de la Diputació de Girona

IRTA

RECERCA | TECNOLOGIA
AGROALIMENTÀRIES

HIGIENE

Neteja i desinfecció de tot el material relacionat amb les vedelles i emmagatzematge exclusiu i net.



✨ FEM-HO FÀCIL



LA MENJADORA NETA I SENSE CONGLOMERATS



LES CASETES NETES, DESINFECTADES I VENTILADES




JAC

-Sec i net.

-Hivern: Envoltar-lo de palla i eixugar-lo després del naixement.

-Estiu: En zona d'ombra i controlar les mosques.




Semega

Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada de la Diputació de Girona

IRTA

RECERCA | TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES

REHIDRATANT ORAL



Observar les femtes matí i tarda. Si són fluides, rehidratar entre preses de llet. Qualitats del rehidratant oral:

- Sodi (Na): 90-130mmol/L
- Glucosa o Glicina: 500-600mOsm/L
- Acetat o Propionat: >50mmol/L
- Balanç cations i anions ($[Na^+] + [K^+] - [Cl^-]$): 60-80

PERIPART

- Zona neta i eixuta.
- Poca densitat animal.
- Atenció al part.

RECORDA

El bon maneig de la recria comença abans del seu naixement.


PROGRAMA VACUNAL



Revisar amb el veterinari l'estratègia tant per mares com per vedelles, segons les patologies de l'explotació.

MELIC

Bona desinfecció i vigilar que no s'infecti (ambient net).



Semega


Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada de la Diputació de Girona

IRTA

RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES




MONITORITZACIÓ



- Valorar el bon encalostament amb el control de proteïnes sèriques a les 24-48h (acceptable si >5).
- Control del pes amb balança o cinta: En 2 mesos s'ha de doblar el pes i creixement $>650\text{g/dia}$.
- Control del consum de pinso abans de deslletar. Mínim $1,5\text{kg/dia}$.
- Controls visuals diaris i anotar incidències: diarrees, estat dels melics, condicions del jaç...



PER MÉS INFORMACIÓ SOBRE
EL MANEIG DEL CALOSTRE:



Semega

Serveis de Millora i Expansió Ramadera
i Genètica Aplicada
de la Diputació de Girona

IRTA

RECERCA | TECNOLOGIA
AGROALIMENTÀRIES

